

# REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

## DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLVII

JUNHO - 1972

N.º 2

## DOIS NOVOS ORTÓPTEROS DE ILHÉUS, BAHIA.

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

Universidade de S. Paulo — Piracicaba

### PHANEROPTERIDAE

*Paracoelophyllum* g.n.

Caput parvum a pronoto usque ad oculos obtectum, fastigio verticis profunde sulcato, utrinque compresso, fronte superne modice rotundatim prominenti, oculis magnis, subrotundatis, antennis gracilibus. Pronotum disco convexiusculo, margine antico modice emarginato, postico rotundato, in medio sulcato, parte posteriore longitudinaliter rugulosa, lobis deflexis aequae longis et latis, rotundatim insertis, perpendicularibus, margine antico recto, infero modice obliquo, postico ample rotundato, angulo antico rotundato. Elytra ovalia, sub parallela, plus quam duplo longiora quam latiora, venis radialibus prope extremitates disjunctis, vena anteriore basi valde incrassata, ramo radiali longe ante medium oriente, ante medium divisorio, ramis flexuosis, ramo anteriore cum ramo posteriore et cum vena uinari anteriore a ramulis transversis connectis, vena hac ramis nonnullis versus marginem posticum elytrorum emittente, vena ulnari posteriore elytri sinistri varicosa, campo tympanali lato, cordiformi, vena plicata paulo expressa, alis elytris vix superantibus. Pedes breves, coxis anticis spina parva, femoribus omnibus subtus sulcatis margine antico spinosis, lobis genicularibus bidentatis, tibiis I e II superne planis, fortiter granulosis, I spina singula vel nulla, extus foramine aperto, intus foramine conchato praeditis, II spinis nonnullis, III complurimis utrinque armatis. Mesosternum lobis triangularibus, metasternum rotundatis. Lamina subgenitalis carinata, apice subtruncata, stylis praedita. Segmentum anale truncatum, formina supraanali angusta, triangulari. Cerci breves, conici, modisissime curvi.

O presente genero difere de *Coelophyllum* Scudder, pelo prono-  
to algo convexo, de margem anterior um tanto recurva, pelos élitros  
ovais de ápice regularmente curvo, as veias radiais caminhando uni-  
das bem para lá do meio e pelas asas praticamente do mesmo com-  
primento dos élitros.

Tipo, a espécie seguinte.

***Paracoelophyllum pedritosilvai* sp. n.**

Characteribus generis, colore lutescenti. Oculi antennaeque par-  
tim castaneo-nigrae. Elytra densissime minutissime puncturata, punc-  
tis majoribus nonnullis in area praeradiali sparsis, necnon maculis  
castaneis irregularibus tribus secundum venas radiales ordinatis, pri-  
ma minore prope campum tympanalem, ultima multo majore prope  
medium elytrorum, campo tympanali ac venis nonnullis castaneis.

Femora I spinis 2-3 ad marginem anticum, II spinis 4-6, III spinis  
9-10, armata. Tibiae I et II granulis spiniferis minutis obscuris den-  
se obtectae, I spina singula vel nulla superne ad marginem posticum,  
II spinis 3-3, III spinis compluribus. Spini pedum omnes rubri.

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Longitudo corporis . . . . .    | 20,0mm |
| Longitudo pronoti . . . . .     | 6,5    |
| Longitudo elytrorum . . . . .   | 39,0   |
| Latitudo elytrorum . . . . .    | 14,0   |
| Longitudo femorum post. . . . . | 15,0   |

Pátria: Ilheus, E. da Bahia.

Tipo: Um macho no Departamento de Zoologia da ESALQ.

O nome da espécie é dado em homenagem ao Dr. PEDRITO SIL-  
VA, entomólogo do Centro de Pesquisas do Cacau (Cepec), Ilheus,  
Bahia e distinto amigo.

## COPIPHORIDAE

*Neoconocephalus guyvalerioi* sp. n.

Testaceus, partim viridis. Fastigium longius quam latius, oculis vix longius, subtus fascia nigra ad apicem ornatum. Pronotum disco subplano, densissime puncturato, antice recto, postice rotundato, lobis deflexis rotundatim insertis. Elytra viridia, femora postica valde superantia, maculis nigris plus minusve seriatis longitudinaliter dispositis. Femora antica subtus spinis 2 ad marginem anticum, intermedia inermia, postica spinis compluribus in punctis nigris implantatis utrinque praedita. Tibiae omnes haud maculatae vel punctatae.

Ovipositor angustus, subrectus, apice acutissimo, extremitatem elytrorum haud attingens.

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Longitudo corporis . . . . .     | 35,0mm |
| Longitudo pronoti . . . . .      | 8,0    |
| Longitudo elytrorum . . . . .    | 52,0   |
| Latitudo elytrorum. . . . .      | 6,0    |
| Longitudo fem. post. . . . .     | 26,0   |
| Longitudo ovipositoris . . . . . | 29,0   |

Pátria: Ilheus, E. da Bahia.

Tipo: Uma fêmea, no Departamento de Zoologia da ESALQ.

Difere de *N. maxillosus* (Fabr.) pelas manchas escuras dos élitros.

O nome da espécie é dado em homenagem a GUY VALÉRIO DOS SANTOS, Tec. Lab. — Entomologia, do Centro de Pesquisas do Cau, Ilheus, Bahia.